

PROPRIÉTÉS

ORILYSE contient 5% de xylène dans de l'huile d'amande douce.

L'huile d'amande douce agit comme émollient pour ramollir le bouchon de cérumen et le xylène agit comme solvant pour le dissoudre.

L'obstruction du conduit auditif peut être causée par l'entrée en contact du cérumen et de l'eau, après un bain par exemple, ou par le nettoyage avec un coton-tige ou un autre moyen, poussant des particules de cire vers le tympan et créant ainsi un bouchon.

Les bouchons épidermiques, quant à eux, sont formés par une hypersécrétion de cire combinée à une desquamation du conduit auditif et sont difficiles à retirer car ils sont plus durs.

INDICATIONS

ORILYSE est indiqué pour éliminer les bouchons de cérumen ou épidermiques (cérumen et résidus de peau) qui se forment dans le conduit auditif et qui sont souvent à l'origine de troubles tels que la perte d'audition, les bourdonnements, les vertiges, parfois accompagnés de maux de têtes et d'otites.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Flacon de 20 ml accompagné d'une pipette compte-gouttes.

COMPOSITION

Huile d'amande douce 95%, xylène 5%.

FRÉQUENCE D'UTILISATION

Appliquer **ORILYSE** dans l'oreille, la dose recommandée est la totalité de la pipette.

Si nécessaire (bouchons durs), répéter l'instillation 2 à 3 fois par jour et continuer le traitement pendant 3 à 5 jours en fonction de la quantité de cérumen à extraire.

Si les symptômes persistent, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Remplir la pipette.
2. Incliner la tête et mettre les gouttes dans votre oreille.
3. Rester dans cette position 5 à 10 minutes.
4. Nettoyer votre oreille avec de l'eau tiède.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser **ORILYSE** après la date d'expiration indiquée sur l'emballage.
- Demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser ce produit immédiatement après une intervention chirurgicale.
- Ne pas utiliser **ORILYSE** si l'emballage est ouvert ou endommagé.
- Pas de précautions particulières de stockage.
- Une fois vide, jeter le flacon conformément aux règles normales de tri des déchets ménagers.

- **TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.**
- VOIE AURICULAIRE.

INTERACTIONS

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser d'autres médicaments, dispositifs médicaux et/ou cosmétiques en même temps que **ORILYSE**.

Il n'existe aucune interaction connue entre **ORILYSE** et d'autres produits de santé.

CONTRE-INDICATIONS

- **ORILYSE** ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à un ou plusieurs composants.
- **ORILYSE** ne doit pas être utilisé en cas d'affection de l'oreille moyenne, comme une inflammation (otite) ou un tympan perforé.
- Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser **ORILYSE**. Il n'existe aucun effet nocif connu sur les femmes enceintes aux doses thérapeutiques indiquées.

EFFETS INDÉSIRABLES

Pendant le traitement avec **ORILYSE**, en particulier s'il est prolongé, une irritation ou des rougeurs (phénomènes de sensibilisation) peuvent être constatés. Dans ce cas, arrêtez le traitement et consultez votre médecin.

TOUTEFOIS, SI VOUS REMARQUEZ L'APPARITION D'UN EFFET INDÉSIRABLE, ARRÊTEZ LE TRAITEMENT ET DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

Date de dernière révision de la notice : Avril 2020


FABRICANT

IBSA Farmaceutici Italia Srl
Via Martiri di Cefalonia, 2
26900 Lodi – Italie
info@ibsa.it



DISTRIBUTEUR

IBSA Pharma SAS
Parc de Sophia-Antipolis
Les 3 Moulins - 280, rue de Goa
06600 ANTIBES - France
mail.fr@ibsaigroup.com



Séparez les éléments avant de trier

0 800 083 330 Service & appel gratuits



Consulter les instructions d'utilisation



Code de lot



Attention : consulter les précautions d'emploi



Date limite d'utilisation



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Fabricant