

ialusetcare®

CRÈME HILOW



Acide hyaluronique de haut et bas poids moléculaires (sel de sodium) 0,4%

PROPRIÉTÉS

L'acide hyaluronique est le composant principal de la substance fondamentale du derme ; la substance fondamentale du derme est la partie de la matrice extracellulaire ayant une fonction de soutien, et contribuant à la santé, à l'hydratation et à l'élasticité du tissu cutané.

L'acide hyaluronique, grâce à son pouvoir hygroscopique particulier, en présence de lésions cutanées, contribue à maintenir le micro-environnement favorable à la restauration des propriétés biologiques et physiologiques de la peau.

ialusetcare® CRÈME HILOW contient une combinaison d'acide hyaluronique de Haut et Bas poids moléculaires.

Les chaînes d'acide hyaluronique dans **ialusetcare® CRÈME HILOW** interagissent en synergie en fournissant au produit des caractéristiques rhéologiques qui permettent l'administration de grandes quantités d'acide hyaluronique, favorisant la réparation naturelle du tissu cutané et épidermique.

L'acide hyaluronique de haut et de bas poids moléculaire utilisé dans **ialusetcare® CRÈME HILOW** est obtenu par bio-fermentation ; l'interaction entre les chaînes d'acide hyaluronique de différents poids moléculaires est obtenue par un procédé thermique breveté, sans aucune modification chimique. Cela garantit une excellente tolérance du dispositif médical.

INDICATIONS

ialusetcare® CRÈME HILOW est indiqué pour le traitement des lésions cutanées telles que les plaies non infectées, les coupures et les brûlures, les ulcères de jambe, les fissures des mains, les fistules, les plaies de décubitus, la dermatite abrasive, les cicatrices et les excoriations.

ialusetcare® CRÈME HILOW est également indiqué dans l'irritation cutanée modérée à sévère et la peau déshydratée, ce qui est observé, par exemple, en radiothérapie.

ialusetcare® CRÈME HILOW peut également être utilisé en cas de cicatrices difficiles (par exemple, brûlures non infectées, ulcères de jambe, fissures des mains, fistules, plaies de décubitus), en tant que support pour la ré-épithélialisation, et en cas de cicatrices majeures, même post-opératoires, pour récupérer l'état physiologique de la peau.

COMPOSITION

Acide hyaluronique de haut et bas poids moléculaires (sel de sodium) 0,4%, cétéaryl glucoside, décylester d'acide oléique, alcool cétéarylique, sodium lauryl sulfate, glycérine anhydre pure, sorbitol 70%, acide sorbique, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, citrate trisodique dihydraté, eau désionisée.

FORMES ET PRÉSENTATIONS

Tube de 25 g

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE

Nettoyez soigneusement la plaie avant chaque application, puis procédez comme décrit ci-dessous :

Appliquez une épaisse couche de crème d'environ 2-3 mm directement sur la plaie, ou étalez la crème sur une gaze stérile et appliquez-la sur la plaie. La gaze peut être maintenue en place avec un bandage approprié.

Appliquez la crème toutes les 24 heures jusqu'à guérison complète.

N'utilisez pas **ialusetcare® CRÈME HILOW** pendant plus de 30 jours.

La cicatrisation doit être évaluée par un médecin.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien refermer le tube après chaque utilisation.

Suivre les procédures appropriées pour nettoyer et désinfecter les plaies, les brûlures et les zones cutanées adjacentes.

La crème restant sur la plaie peut facilement être enlevée avec de l'eau avant chaque application.

L'utilisation de **ialusetcare® CRÈME HILOW** sur les ulcères de jambe ne dispense pas d'un traitement compressif (bas ou bandes).

N'utilisez pas **ialusetcare® CRÈME HILOW** si l'emballage est endommagé.

Si vous avez des questions sur l'utilisation de **ialusetcare® CRÈME HILOW**, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Pour usage externe uniquement.

Ne pas avaler.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

CONTRE-INDICATIONS

ialusetcare® CRÈME HILOW ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'acide hyaluronique (sel de sodium) ou à l'un des autres composants.

EFFETS SECONDAIRES

Des réactions locales d'hypersensibilité peuvent parfois survenir.

SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS UTILISER AU-DELÀ DE LA DATE D'EXPIRATION INDIQUÉE SUR L'EMBALLAGE.

Ce dispositif médical doit être conservé à des températures inférieures à 25°C.

Utiliser dans les 90 jours suivant la première ouverture.

Date d'expiration : 36 mois.

La date d'expiration indique la durée de conservation du dispositif médical.

Année d'apposition du marquage CE : 2019

Date de dernière révision de la notice : **Novembre 2019**

FABRICANT

IBSA Farmaceutici Italia Srl

Via Martiri di Cefalonia, 2

26900 Lodi - Italie

info@ibsa.it

CE 0051

DISTRIBUTEUR

IBSA Pharma SAS

Parc de Sophia-Antipolis

Les 3 Moulins - 280, rue de Goa

06600 ANTIBES - France

mail.fr@ibsaigroup.com

0 800 083 330

Service & appel
gratuits



Conserver à l'abri de la lumière du soleil



Limite supérieure de température : 25°C



Consulter les instructions d'utilisation



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Code de lot



Date limite d'utilisation



Fabricant



**LE TRI
+ FACILE**

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICE



Séparez les éléments avant de trier